



## RECOMENDACIONES PARA DIABÉTICOS ANTE OPERACIONES O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

(HACER CLIC DONDE CORRESPONDA)

1. Si se administra usted **INSULINA (RÁPIDA/MIXTA)** y va a **VOLVER A CASA EN MENOS DE CUATRO HORAS** tras finalizar la operación o prueba complementaria.
2. Si se administra usted **INSULINA (RÁPIDA/MIXTA)** y va a **QUEDARSE INGRESADO UNAS HORAS O DÍAS** tras la operación.
3. Si toma **PASTILLAS** y va a **QUEDARSE INGRESADO** unas horas o días tras la prueba realizada bien **POR LA MAÑANA o POR LA TARDE.**
4. Si toma **PASTILLAS** y va a **VOLVER A CASA EN MENOS DE CUATRO HORAS** de finalizar la prueba realizada **POR LA MAÑANA o POR LA TARDE.**

*Nota: Se recomienda utilizar los marcadores de este documento en PDF, en el menú de la izquierda del programa Adobe Acrobat.*



## **RECOMENDACIONES PARA DIABÉTICOS ANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS**

1. Si se administra usted **INSULINA (RÁPIDA/MIXTA)** y va a **VOLVER A CASA EN MENOS DE CUATRO HORAS** tras finalizar la operación o prueba complementaria.

- *Su prueba o intervención se realizará a primera hora de la mañana.*
- *Vendrá en ayunas y sin administrarse su insulina.*
- *Al volver a su domicilio desayunará y se administrará su insulina.*



## **RECOMENDACIONES PARA DIABÉTICOS ANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS**

2. Si se administra usted **INSULINA (RÁPIDA/MIXTA)** y va a **QUEDARSE INGRESADO UNAS HORAS O DÍAS** tras la operación.

- *Su prueba o intervención se realizará a primera hora de la mañana.*
- *Vendrá en ayunas y sin administrarse su insulina.*
- *Nosotros trataremos su diabetes en el hospital.*



## RECOMENDACIONES PARA DIABÉTICOS ANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

3. Si toma **PASTILLAS** y va a **QUEDARSE INGRESADO** unas horas o días tras la prueba realizada bien **POR LA MAÑANA o POR LA TARDE**.

### **POR LA MAÑANA:**

- *Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.*
- *No desayuna ni se toma la pastilla del desayuno.*
- *Si se administra insulina rápida /mixta complementaria, no administrarse la dosis de la mañana. Se hará a 1ª hora de la mañana.*
- *Si se administra insulina lenta (lantus, levemir...) complementaria por la mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=...UI)*
- *Nosotros trataremos su diabetes en el hospital.*

### **POR LA TARDE:**

- *Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.*
- *Puede desayunar (a 1ª hora de la mañana). No puede comer a mediodía.*
- *No tomará la pastilla del desayuno ni la de la comida.*
- *Si se administra insulina lenta (lantus, levemir...) complementaria por la mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=...UI)*
- *Nosotros trataremos su diabetes en el hospital.*



## **RECOMENDACIONES PARA DIABÉTICOS ANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS**

4. Si toma **PASTILLAS** y va a **VOLVER A CASA EN MENOS DE CUATRO HORAS** de finalizar la prueba realizada **POR LA MAÑANA o POR LA TARDE**.

### **POR LA MAÑANA:**

- *Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.*
- *No desayuna ni se toma la pastilla del desayuno.*
- *Si se administra insulina rápida /mixta complementaria, no administrarse la dosis de la mañana. Se hará a 1ª hora de la mañana.*
- *Si se administra insulina lenta (lantus®, levemir®...) complementaria por la mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=...UI)*
- *Al volver al domicilio, reanudará su tratamiento habitual, coincidiendo con la comida.*

### **POR LA TARDE:**

- *Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.*
- *Puede desayunar (a 1ª hora de la mañana). No puede comer a mediodía.*
- *No tomará la pastilla del desayuno ni la de la comida.*
- *Si se administra insulina lenta (lantus®, levemir®...) complementaria por la mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=...UI).*
- *Al volver al domicilio, reanudará su tratamiento habitual, coincidiendo con la cena.*

**HI-ANESTESIA-03**