



PAZIENTEARI "A" TOXINA BOTULINIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA EBENTRAZIORAKO

Ebentrazioa edo hernia-ebakidura, interbentzio kirurgiko batean, **abdomeneko horman** egindako ebakidura baten **orbaintze txarraren** ondorioa da.

Horren ondorioz, abdomeneko horman akats bat dago (zuloa), eta hortik atera daiteke sabeleko edukia (hesteetako heldulekuak), eta horrek buxadura, mina eta, egoerarik larrienetan, hesteetako nekrosia eragin dezake.

Batzuetan, ebakuntza aurreko egokitzapen bat egin behar da pareta abdominalean toxina botulinikoa erabiliz, ebakuntza aurreko pneumoperitoneoarekin lotuta egon edo ez, kirurgia egin baino 4-6 aste lehenago, konponketa optimoa lortzeko.

Prozedura:

Sabelaldearen alde bakoitzean 5 puntu sartzen dira, eta horrela ekografikoki kokatzen da sabelaldeko muskulatura. Larruazala anestesiatuta, 30 IU injektatuko dira 10 puntuetako bakoitzean.

Prozedurak 30 minutu inguru irauten du.

Prozeduraren arriskuak:


Egoera gehienetan, prozedura horrek ez du inolako eragozpenik sortuko, larruazalean ziztada egitea izan ezik.

Lortutako emaitzek balizko arriskuak konpentsatzen dituzte:

- Abdomeneko organo bat kaltetu daiteke, eta horrek, oro har, ez du inolako tratamendurik behar. Muturreko egoeretan, kirurgia egitera behartu dezake.
- Odol-hodi bat (arteria edo zaina) lesionatu daiteke; odoljarrio handia badu, eta salbuespen gisa, kirurgia edo beste prozeduraren bat behar izan dezake odoljarria uzteko.
- Salbuespen gisa, konplikazioek heriotza eragin dezakete.

Izan daitezkeen alternatibak:

Aukera posible bakarra botoxa ez infiltratzea litzateke, eta horrek ebentrazioaren etorkizuneko kirurgiak arrakasta izateko aukera murriztuko luke.





A toxina botulinikoa emateko kontraindikazioak:

Abisatu medikuari A toxina botulinikoari alergia badiozu. Kontraindikatuta dago aminoglukosidoekin. Polimixinen, tetraziklinen eta linkomizinareen elkarketan arreta handiz erabiltzea, mioerlaxatzaileez gain.

Toxina botulinikoaren ondorio kaltegarri posibleak:

Oro har, kontrako erreakzioak injekzioa eman eta hurrengo egunetan gertatzen dira, eta, oro har, iragankorrak badira ere, hilabete batzuk iraun dezakete, edo, gutxitan, denbora luzeagoa.

Toxina botulinikoak muskulu-ehunean duen ahultasun lokala farmakologikoki espero den ekintza da. Hala ere, injekzio-puntuaren alboko eta/edo urrutiko muskuluen ahultasuna antzeman da.

Edozein injekzio ematean bezala, min lokalizatua, inflamazioa, parestesia, hipoestesia, mina haztatzean, inflamazioa/edema, eritema, infekzio lokalizatua, odoljariora eta/edo hematoma ager daitezke.