




## PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: TRATAMIENTO PARA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CON DECAPEPTYL® 0.1 mg polvo y disolvente para solución inyectable

### ANTES DE LA INYECCIÓN

- Lavarse las manos.
- Preparar todo lo necesario:
  - 2 viales de Decapeptyl® diario.
  - 1 ampolla de disolvente.
  - Jeringa de 2 ml.
  - Aguja de preparación (calibre 18).
  - Aguja fina para la inyección subcutánea (calibre 25).
  - Torunda impregnada en alcohol.
  - Torunda.

El Kit de administración se entregará en la Unidad de Reproducción Asistida.




### PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN. PREPARACIÓN Y RECONSTITUCIÓN

1. Quitar la tapa de cierre de plástico amarilla de la parte superior de los dos viales de Decapeptyl®.
2. Golpear suavemente la parte superior de la ampolla de disolvente para desplazar el líquido a la parte inferior de ésta.
3. Colocar la ampolla con el punto azul mirando hacia ti, cubrir la parte superior con una gasa para no cortarse (opcional) y romperla.
4. Colocar la aguja de mayor tamaño en la jeringa, retirar la cubierta e insertarla en la ampolla ya abierta de disolvente y aspirarlo.
5. Insertar la aguja a través de la zona central del tapón de goma de la parte superior del vial de Decapeptyl® diario, introducir el contenido de la jeringa.
6. Para facilitar la disolución del polvo, sin sacar la aguja ni soltar el émbolo, se realiza un movimiento circular suave con la mano.
7. Girar el vial boca abajo y aspirar todo el contenido del vial.
8. Repetir los pasos 5 a 7 con el segundo vial de Decapeptyl®.
9. Golpear suavemente la jeringa con la aguja hacia arriba para concentrar todas las burbujas de aire en la parte superior. Presionar lentamente el émbolo para eliminarlas.
10. Retirar la aguja de preparación de la jeringa, colocar la aguja de menor tamaño y retirar la cubierta protectora.



## INYECTAR EL MEDICAMENTO

- El mejor lugar para inyectar el medicamento es el abdomen, justo por debajo y en los laterales del ombligo, respetando los primeros 2-3 cm desde éste. También, se recomienda cambiar cada día el punto de inyección de la dosis, para proteger la piel.
- Limpiar la zona de inyección frotándola con una torunda de alcohol y esperar hasta que se seque (tardará alrededor de 1 minuto).
- Pellizca firmemente la piel. Con la otra mano, inserte la aguja en la piel en un ángulo de 90° respecto a la superficie.
- Presionamos el émbolo de la jeringa lentamente y de forma constante, de modo que la solución sea inyectada correctamente y la piel no se dañe.
- Espera 10 segundos antes de retirar la aguja de la piel.
- Retira la aguja y presiona en el sitio de la inyección con un algodón.



## DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

- Coloca el sistema de seguridad de la aguja de inyección.
- Desecha inmediatamente la aguja utilizada de forma segura.

### MÁS INFORMACIÓN:

- El medicamento debe utilizarse inmediatamente después de la reconstrucción del mismo.
- Mantener a temperatura ambiente por debajo de 25°.