




PRESTATZEA ETA EMATEA: OBULUTEGIA ESTIMULATZEKO TRATAMENDUA DEKAPEPTYL ® BIDEZ, 0.1 MG hautsa eta disolbatzailea, soluzio injektagarrirako

INJEKZIOA BAINO LEHEN

- Eskuak garbi itzazu.
- Beharrezko guztia prestatu:
 - Decapeptyl ®-eko 2 flasko egunero.
 - Disolbatzaile-anpoila bat.
 - 2 ml-ko xiringa.
 - Prestatzeko orratza (18. kalibreakoa).
 - Larruazalpeko injeziorako orratz fina (25. kalibreakoa).
 - Alkoholez blaitutako torunda.
 - Torunda.

Administrazio-kit-a Laguntza Bidezko Ugalketa Unitatean entregatuko da.




INJEKZIOA EGITEKO URRATSAK. PRESTATZEA ETA BERRERATZEA

1. Decapeptyl ®-eko bi flaskoen goialdeko plastikoko horiko itxitura-estalkia kendu.
2. Disolbatzaile-anpuluaren goiko aldea emeki kolpatu, likidoa anpuluaren beheko aldera lekualdatzeko.
3. Puntu urdina duen anpoila zuregana begira jarri, goiko aldea gaza batez estali ez mozteko (aukerakoa) eta hautsi.
4. Orratz handiena xiringan jarri, estalkia kendu eta irekita dagoen disolbatzaile-anpulan sartu eta xurgatu.
5. Eguneroko Decapeptyl ® ontziaren goiko aldeko gomazko tapoiaren erdialdean sartu, eta xiringaren edukia sartu.
6. Hautsa errazago desegiteko, orratza atera gabe eta enboloa askatu gabe, mugimendu zirkular leun bat egiten da eskua erabiliz.
7. Flaskoa ahoz behera biratu eta flaskoaren eduki guztia xurgatu.
8. Errepikatu 5.etik 7.erako urratsak Decapeptyl ®-en bigarren ontzia erabiliz.
9. Xiringa emeki-emeki kolpatu orratza erabiliz gorantz, aire-burbuila guztiak goiko aldean kontzentratzeko. Sakatu poliki-poliki enboloa, horiek kentzeko.
10. Xiringa prestatzeko orratza kendu, orratz txikiena jarri eta babes-estalkia kendu.



MEDIKAMENTUA INJEKTATZEAN

- Sendagaia injektatzeko lekurik onena sabelaldea da, zilborraren azpitik eta alboetan, zilborretik lehenengo 2-3 cm-ak errespetatuz. Halaber, egunero dosiaren injekzio-eremua aldatzea gomendatzen da, larruazala babesteko.
- Garbitu injekzio-eremua alkohol-torunda batez igurtziz, eta itxaron lehortu arte (minutu bat inguru beharko da).
- Atximurka egin larruazalari. Beste eskuarekin, sartu orratza azalean, azalarekiko 90°-ko angeluan.
- Xiringaren enboloa poliki eta etengabe estutuko dugu, disoluzioa behar bezala injektatzeko eta larruazala ez kaltetzeko.
- Itxaron 10 segundo orratza azaletik kendu baino lehenago.
- Kendu orratza eta estutu injekzioaren eremuan kotoi bat erabiliz.



INJEKZIOAREN ONDOREN

- Jarri injekzio-orratzaren segurtasun-sistema.
- Bota ezazu berehala modu seguruan erabilitako orratza.

INFORMAZIO GEHIAGO:

- Sendagaia berreraiki eta berehala erabili behar da.
- Giro-tenperaturan eduki 25°-tik behera.