



## GAMMAGRAFIA PET/TK F18-FDGREKIN

MEDIKUNTZA NUKLEARRA

### ZER DA PET/TAC GAMMAGRAFIA F18-FDGREKIN?

PET/TK teknika diagnostikoak konbinatzen ditu Tomografia Konputarizatuak (TK) eskaintzen duen informazio anatomikoa eta ekipo berean Positroien Emisio bidezko Tomografiaren Metabolikoa (PET). PET/TK proba erraza, minik gabea eta segurua da.

### MIAKETARAKO BEHARREZKO PRESTAKUNTZA:

Miaketa egin aurreko egunean ez da ariketa fisiko garrantzitsurik egingo.

Miaketa egunean 6 orduko BARAUALDIAN joango zara, URA har dezakezu. Zure ohiko medikazioa har dezakezu, kontrakoa esaten ez badizugu.

Eraman arropa eroso. Ez da komeni metalezko objektuak eramatea (eraztunak, eskumuturrekoak, belarritakoak).

13: 00etatik aurrera deitzen bazaizu, gosari arina har dezakezu (6 ordu lehenago), azukrea duten elikagaiak eta edariak saihestu behar dituzula kontuan hartuta.

### ZERTAN DATZA?

Proba egiteko, erradiofarmakoa zainean emango dizute.

Glukosa-zifra zehaztuko da Medikuntza Nuklearrera iristean.

Behin erradiofarmakoa injektatuta, atsedenean egongo zara ordu betez, ura edan behar duzu bitartean (ur botila ertain bat ekartzea gomendatzen dugu). Kasu batzuetan, medikuaren iritziz, beharrezkoa izan daiteke kontraste iododun benosoa ematea, irudien kalitatea hobetzeko. Une bakoitzean jakinaraziko zaizu.

Tomografoaren miaketak 30 minutu inguru irauten du.

Medikuntza Nuklearreko Zerbitzuko egonaldiaren batez besteko iraupena 2 ordukoa da. Ikasketa osagarriak egin behar bazaizkio, egonaldia luzatu egin daiteke.

### OHARRAK:

Gutxitan, kontraste ioido endobenosoak goragalea, gorakoak eta larruazalaren gorritasuna eragin ditzake. Salbuespen gisa, tratamendu ambulatorioa edo ospitalekoa eskatzen duten erreakzio larriagoak gertatzen dira. Estatistikoki heriotza bat deskribatzen da 3.700.000 miaketatik behin. Giltzurrun-funtzioan duen eragina ere ezagutzen da. Horregatik, giltzurrun-funtzioaren berri izan dugu, baita asmarik, alergia medikamentutsurik edo kontraste iodatuen aurreko erreakziorik duen ere. Ematen digun edozein datu erantsi kontuan hartuko da. Nolanahi ere, konplikazioen bat gertatuz gero, zentro honetako baliabide tekniko eta giza baliabide guztiak prest egongo dira arazoa konpontzen saiatzeko. Klaustrofobiaren sentrazioa oso txikia da PET batean. Ez dago gela itxi batean, baina garrantzitsua da jakinaraztea klaustrofobia duen.

Muskulu-lasaigarri bat ahotik ematen badizute, proba egin ondoren ez gidatzea gomendatzen dizugu (erizainek eman aurretik jakinaraziko dizute).

Proba hori ez da **haurdun dauden emakumeekin** egin behar. **Bularreko ama** bazara, esaezu erizainei.