



RECOMENDACIONES: PACIENTE PORTADOR DE CATETER DOBLE J

El catéter doble J es un pequeño “tubo” que permite el paso de la orina del riñón a la vejiga, se coloca cuando hay un problema de obstrucción del uréter, o para facilitar la cicatrización después de una cirugía.

Es un catéter interno, podrá orinar normalmente.

Puede ocasionar alguna molestia en la zona baja del abdomen (como deseo frecuente de orinar, ardor) o en la región lumbar (durante la micción). Suelen disminuir con el tiempo.

Es aconsejable orinar con frecuencia, sin aguantar mucho cuando tenga ganas de orinar y no haga fuerza al orinar.

Es normal que la orina se tiña de sangre, normalmente se aclara bebiendo abundantes líquidos.

El tiempo que debe permanecer el catéter es variable, su médico le explicará hasta cuando lo necesita.

Vigile su temperatura una vez al día, preferentemente por la tarde

Acuda a su centro de salud y consulte con su enfermera de Atención Primaria:

- Si tiene más de 38°C.
- Si presenta sangrado importante con presencia de coágulos.
- Si tiene imposibilidad para orinar.

Para cualquier duda, puede contactar con nosotros en el teléfono: 945 00 75 47 (HUACE-Consulta de Urología).