



## INFORMACIÓN AL PACIENTE CON INSTILACIONES DE *BCG*

### ACCIÓN:

La instilación de BCG es una terapia que consiste en la introducción de un medicamento en la vejiga que produce una reacción inflamatoria local tras su administración.

Esta reacción inflamatoria disminuye la posibilidad de reaparición de tumores vesicales en pacientes determinados. También, se utiliza para mejorar síntomas de pacientes con cistitis crónica en casos seleccionados.

### MODO DE EMPLEO:

Se utiliza mediante instilaciones periódicas a través de una sonda vesical de pequeño calibre.

Este tratamiento se administra en el HOSPITAL DÍA MÉDICO –HUA TXAGORRITXU.

Después de la administración del tratamiento, se recomienda intentar no orinar en las próximas dos horas.

### RECOMENDACIONES:

Tras la administración, una vez en su domicilio, debe permanecer acostado / sentado durante 2 horas, según criterio de confortabilidad y bienestar.

A las dos horas se recomienda la primera micción, mejor sentado. Es conveniente que después de las micciones en las primeras seis horas se desinfeste el inodoro con lejía (aproximadamente 200 ml. de lejía y tirar de la cadena a los 15 minutos).

Debe ingerir de 2 litros de agua el día de la instilación DESPUÉS DE LA 1ª MICCIÓN.

### EFFECTOS SECUNDARIOS:

Durante las primeras 48 horas puede presentar:

- sangre en la orina, deseos fuertes de orinar, dolor al orinar y aumento de la frecuencia de la micción, dolores articulares, fiebre con escalofríos y malestar general.
- Si el paciente presenta fiebre de 38° durante más de dos días, o malestar general severo, o sangrado que no remita, recomendamos acudir a Urgencias.

