



## HOJA INFORMATIVA DE IMPLANTE DE MARCAPASOS DEFINITIVO SIN ELECTRODO

### ¿En qué consiste el procedimiento?

En determinados trastornos del ritmo es posible utilizar un marcapasos sin cable. La ventaja de este dispositivo radica en que evita el riesgo de infección en la zona bajo la piel que conlleva el marcapasos convencional y que constituye su complicación grave más frecuente.

Este marcapasos se coloca a través de una punción en la vena femoral, por donde se introduce un catéter con el marcapasos en su interior que hacemos llegar hasta el corazón.

### ¿Cómo debo prepararme para la prueba?

Es necesario que esté en AYUNAS desde al menos 6 horas antes de la prueba.

Puede tomar su medicación habitual del desayuno con un poco de agua.

Si toma medicación anticoagulante (Sintrom®, warfarina, dabigatran, apixaban, rivaroxaban o edoxaban) se le indicará específicamente cómo administrar dicha medicación.

Si es diabético:

- Dosis de insulina habitual la noche previa.
- No tomará ninguna pastilla antidiabética en el desayuno.
- No administrarse la INSULINA RAPIDA previa al procedimiento.
- Si usted se administra insulina basal por la mañana (Levemir®, degludec, glargina...), administrar la dosis habitual TRAS EL PROCEDIMIENTO.

Si tienen dentadura postiza deberá quitársela en el momento del ingreso en la planta de acogida.

Si es necesario le rasurarán la zona de la ingle derecha, pudiendo realizarlo usted en su domicilio antes de la prueba.

### ¿Dónde me realizarán el implante?

En la planta 5º, área D del HUA-Txagorritxu.



## ¿Cómo me realizarán el procedimiento?

En la gran mayoría de los casos la intervención se realiza con anestesia local y se suele utilizar simultáneamente sedación y analgesia para que el procedimiento se tolere de forma óptima. Por este motivo, será valorado por un Anestesiista.

La/el enfermera/o que le acoja en la unidad de ingreso le colocará una vía venosa preferiblemente en el brazo derecho para la administración de medicación que pueda precisar durante el procedimiento, así como la administración de contraste yodado si es necesario.

Se le tumbará en la camilla con el camisón que le habrán dispensado en la habitación de acogida y descubriendo su cuerpo sólo cuando sea necesario. Se le colocarán electrodos para ver el registro de la actividad de su corazón con ECG durante todo el procedimiento, así como un manguito para la toma de tensión arterial y un saturímetro en el dedo.

Posteriormente, se le colocará un paño quirúrgico para tapar su cuerpo dejando al descubierto únicamente la zona de la ingle derecha, donde se le aplicará anestesia local en la zona donde se efectuará la punción para que el procedimiento no resulte doloroso.

La intervención tendrá una duración aproximada de unos 45-60 minutos.

## ¿Qué debo hacer después de la prueba?

Permanecerá ingresado en las próximas 24h.

No podrá comer hasta pasadas 2 horas de la prueba.

Deberá guardar reposo absoluto de la extremidad inferior derecha durante las 6-8h posteriores al implante del dispositivo.