



## HOJA INFORMATIVA DE RECAMBIO DE SISTEMA DE ESTIMULACIÓN PERMANENTE

### ¿En qué consiste la prueba?

La unidad de estimulación que se le implantó necesita ser sustituida por una nueva.

Con anestesia local se realizará una pequeña incisión en la piel para extraer su unidad de estimulación y colocar una nueva unida a los electrodos que usted lleva ya implantados.

En el quirófano se confirmará el correcto funcionamiento de los cables. Si no lo fuera se sustituirían por unos nuevos; en ese caso el procedimiento se convertiría en una operación similar a la inicial.

Lo más frecuente de una operación de recambio es precisar solamente una sustitución de la unidad de estimulación con lo que técnicamente es un procedimiento mucho más simple que la primera intervención.

### ¿Cómo debo prepararme para la prueba?

Es necesario que esté en AYUNAS desde al menos 6 horas antes de la prueba.

Puede tomar su medicación habitual del desayuno con un poco de agua.

Si toma medicación anticoagulante (Sintrom®, warfarina, dabigatran, apixaban, rivaroxaban o edoxaban) se le indicará específicamente cómo administrar dicha medicación.

Si es diabético:

- Dosis de insulina habitual la noche previa.
- No tomará ninguna pastilla antidiabética en el desayuno.
- No administrarse la INSULINA RAPIDA previa al procedimiento.
- Si usted se administra insulina basal por la mañana (Levemir®, degludec, glargina...), administrar la dosis habitual TRAS EL PROCEDIMIENTO.

Si tiene dentadura postiza deberá quitársela en el momento de ingreso en la unidad de acogida.

### ¿Dónde me realizarán la prueba?

En la planta 5º, área D del HUA-Txagorritxu



### **¿Cómo me realizarán la prueba?**

La prueba se realizará con anestesia local.

La/el enfermera/o le colocará una vía venosa en el brazo para la administración de medicación que requiera durante el procedimiento.

Se le tumbará en la camilla con el camisón que le habrán dispensado en la habitación de acogida y descubriendo su cuerpo sólo cuando sea necesario. Se le colocarán electrodos para ver el registro de la actividad de su corazón con ECG durante todo el procedimiento, así como un manguito para la toma de tensión arterial y un saturímetro en el dedo.

Posteriormente se le colocará un paño quirúrgico para tapar su cuerpo dejando al descubierto únicamente la zona de intervención, donde se le aplicará anestesia local en la zona donde se efectuará la punción, para que el procedimiento no resulte doloroso.

La duración aproximada del procedimiento es variable, entre 30-90 minutos.

### **¿Qué debo hacer después de la prueba?**

Permanecerá en la habitación hasta que sea dado de alta en las horas siguientes a la realización del recambio.

No podrá comer hasta pasadas 2 horas de la prueba.