



HOJA INFORMATIVA DE TEST DE AJMALINA

¿En qué consiste la prueba?

El resultado de su electrocardiograma (ECG) le hace sospechar al equipo médico que podría presentar el síndrome de Brugada (una alteración eléctrica del corazón). Mediante el test de ajmalina se busca confirmar o descartarlo.

¿Cómo debo prepararme para la prueba?

Es necesario que no coma ni beba nada durante al menos 6 horas antes de la prueba. Puede tomar su medicación habitual del desayuno con un poco de agua.

Si toma anticoagulantes (medicamento que previene la formación de trombos o coágulos), el equipo médico le habrá explicado cómo tomarlos esos días.

Si tiene diabetes, siga estas instrucciones:

- La noche anterior: tome su medicación habitual.
- El día del procedimiento: no tome pastillas antidiabéticas en el desayuno.
- No se ponga INSULINA RÁPIDA antes del procedimiento.
- Si usa insulina por la mañana, póngasela DESPUÉS del procedimiento.

Acuda acompañada/o a la prueba, puede necesitar ayuda al finalizar.

¿A dónde tengo que dirigirme el día de la prueba?

A la planta 5º, área D del HUA-Txagorritxu.

¿Cómo me realizarán la prueba?

- Se le tumbará en la camilla con el cuerpo descubierto de cintura para arriba.
- Se le monitorizará durante todo el procedimiento mediante:
 - Unas pegatinas (electrodos) para ver el registro de la actividad de su corazón (electrocardiograma) durante todo el procedimiento.
 - Un manguito para la toma de tensión arterial.
- La/el enfermera/o le colocará una vía venosa (un catéter fino) preferiblemente en el brazo derecho para administrarle ajmalina. Se harán varios ECG durante la siguiente media hora. Según el resultado, su cardióloga/o evaluará si existe o no la alteración.

La duración aproximada del estudio es variable, entre 20 y 30 minutos.

¿Qué debo hacer después de la prueba?

Permanecerá en observación durante las 2 a 4 horas posteriores a la finalización de la prueba.