



HOJA INFORMATIVA DE TEST DE AJMALINA

¿En qué consiste la prueba?

Dado que el electrocardiograma convencional produce dudas diagnósticas, en caso de sospecha de Síndrome Brugada se realiza la administración endovenosa de ajmalina para diferenciar con mucha mayor seguridad la presencia o ausencia de dicha alteración, denominada patrón de Brugada tipo I en el electrocardiograma.

¿Cómo debo prepararme para la prueba?

Es necesario que esté en AYUNAS desde al menos 6 horas antes de la prueba.

Puede tomar su medicación habitual del desayuno con un poco de agua.

Si es diabético:

- Dosis de insulina habitual la noche previa.
- No tomará ninguna pastilla antidiabética en el desayuno.
- No administrarse la INSULINA RAPIDA previa al procedimiento.
- Si usted se administra insulina basal por la mañana (Levemir®, degludec, glargina...), administrar la dosis habitual TRAS EL PROCEDIMIENTO.

Si tiene dentadura postiza deberá quitársela en el momento de realizar la prueba.

Es muy conveniente que el día de la prueba acuda acompañado por un familiar o amigo.

¿Dónde me realizarán la prueba?

En la planta 5º, área A del HUA-Txagorritxu.

¿Cómo me realizarán la prueba?

Se le tumbará en la camilla con su cuerpo descubierto de cintura para arriba y se le colocarán electrodos para ver el registro de su ECG durante todo el estudio, así como un manguito para la toma de tensión arterial.

La/el enfermera/o le colocará una vía venosa en el brazo derecho preferiblemente para administración de ajmalina disuelta en un suero y a una dosis adaptada a su peso. Se practicarán diversos electrocardiogramas durante la siguiente media hora y, según el trazado, el cardiólogo evaluará la presencia o ausencia de dicha alteración en el electrocardiograma.

La duración aproximada del estudio es variable, entre 20-30 minutos.

¿Qué debo hacer después de la prueba?

Permanecerá ingresado durante las 2-4 horas posteriores a la finalización de la prueba.