



FÁRMACOS Y SÍNDROME DE BRUGADA

El síndrome de Brugada es una **enfermedad hereditaria** caracterizada por una anomalía electrocardiográfica (ECG) y un aumento del riesgo de arritmias malignas.

Hay algunas circunstancias que pueden desencadenar dichas arritmias en las personas que presentan este síndrome, y que, por tanto, deben evitar. De esta manera la fiebre debe ser tratada y debe evitarse el consumo de drogas como la cocaína o el abuso del alcohol.

También se ha visto que determinados medicamentos pueden agravar las alteraciones eléctricas en las personas afectadas por el síndrome de Brugada y, por lo tanto, debe evitarse su uso en ellas. Se aconseja no tomar las siguientes medicaciones:

FÁRMACOS A EVITAR COMPLETAMENTE:

- **Medicamentos antiarrítmicos***: ajmalina, allapinina, ethacizina, flecainida, pilsicainida, procainamida, propafenona.
- **Psicotrópicos**: amitriptilina, clomipramina, desipramina, litio, loxapina, nortriptilina, oxcarbazepina, trifluoperazina.
- **Anestésicos / analgésicos***: bupivacaína, procaina, propofol.
- **Otras sustancias**: acetilcolina, alcohol (dosis tóxicas), cannabis, cocaína, ergonovina.

* Para obtener las recomendaciones más recientes, por favor, visite <http://www.brugadadrugs.org/emergencias>

FÁRMACOS A EVITAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE:

- **Medicamentos antiarrítmicos**: amiodarona, cibenzolina, disopiramida, lidocaína*, propranolol, verapamilo, vernakalant.
- **Psicotrópicos**: bupropión, carbamazepina, ciamemazina, clotiapina, dosulepina, doxepina, fluoxetina, fluvoxamina, imipramina, lamotrigina, maprotilina, paroxetina, perfenazina, fenitoína, tioridazina.
- **Anestésicos / analgésicos**: ketamine, tramadol.
- **Otras sustancias**: demenidrinato, difenidramina, edrofonio, indapamida, metoclopramida, terfenadina /fexofenadina.



Osakidetza

ARABAKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
ARABA



* El uso de lidocaína para la anestesia local (por ejemplo, por dentistas) parece ser segura siempre que se utilicen dosis bajas y si se combina con adrenalina (epinefrina) ya que se consigue un efecto estrictamente local.

En caso de fiebre, se recomienda hacer un seguimiento electrocardiográfico en combinación con la disminución de la temperatura del cuerpo (por ejemplo, mediante el uso de paracetamol).

Por favor, recuerden que muchas prescripciones contienen una combinación de diferentes fármacos. Además, la presencia *o ausencia* de un medicamento en particular en esta lista no presupone un uso nocivo *o seguro* de esa droga en particular en este tipo de pacientes.

Para obtener más recomendaciones sobre las drogas que deben ser evitadas por las personas con síndrome de Brugada, por favor, visite <http://www.brugadadrugs.org>