



ABLAZIO SEPTALARI BURUZKO INFORMAZIO-ORRIA

Zertan datza prozedura?

Ablazio septala kateterismo-teknika bat da, miokardiopatia hipertrofiko buxatzailea duten pazienteen funtzio kardiakoa eta sintomak hobetzeko erabiltzen dena.

Teknika honetan, kateterizazio selektiboaren bidez, odola bihotzaren irteerara igarotzeko zailtasuna eragiten duen trenkadaren eremu hipertrofikoa irristatzen duten septalen arteria edo arteriak lokalizatzen dira. Ehunean lesioa eragiten da, alkohola injektatuz; adarrean baloi bat puzten den bitartean. Horrek berehala gutxituko du trenkada hipertrofikoak egiten duen interferentzia, eta are gehiago hobetuko du aste batzuen buruan, hain zuzen ere, eremua finkatzean, eta horrek haren lodiera murriztuko du.

Prozeduran zehar, taupada-markagailuko kable iragankor bat jarriko dute bena-bide femoraletik, agian zure bihotza estimulatu behar da eta.

Proba amaitzean, kateterrak kendu eta ziztadaren eremua konprimituko da, behar den denboran.

Nola prestatu behar dut probarako?

Komeni da pazientea BARAURIK egotea proba egin baino gutxienez 6 ordu lehenagotik.

Hortzordea baduzu, harrera-solairuan sartzean kendu beharko duzu.

Non egingo didate prozedura?

5. solairuan, AUO Txagorritxuko D eremuan.

Telefonoz jakinaraziko dizute aurreko egunetan, zein egun eta ordutan sartu behar duzun, eta zure ohiko tratamendua aldatu eta/edo eten egin dela jakinaraziko dizute.

Nola egingo didate prozedura?

Ospitaleratze-unitatean hartuko zaituen erizainak zain-bide bat jarriko dizu, ahal dela ezkerreko besoan, prozeduran zehar behar izan ditzakezun medikazioak emateko.

Botikak emango dizkizute, lasaiago eta erlaxatuago egon zaitezten.



Ohatilan etzango zaituzte harrera-gelan emango zizuten ohe-atorra jantzita, eta beharrezkoa denean soilik biluztuko duzu zure gorputza. Prozedura osoan zure bihotzaren jardueraren erregistroa ikusteko elektrodoak jarriko dizkizute, baita tentsio arteriala hartzeko mahukatxo bat eta atzamarrean saturimetro bat ere.

Ondoren, oihal kirurgiko bat jarriko zaizu gorputza estaltzeko, eta ziztada egingo den eremua soilik agerian utziko da (eskumuturra edo iztaia). Bertan anestesia lokala emango dizute, prozedura mingarria izan ez dadin.

Ablazioa egiteko alkohola ematean, sedazio leuna erabiltzen da, gehienetan intubazio orotrakealik gabe, anestesioologo batek emanda.

Zer egin behar dut probaren ondoren?

Prozeduraren ondoren, 48 ordu igaroko ditu medikuntza intentsiboko unitatean, monitorizazioarekin bihotz-erritmoa zaintzeko, eta, ondoren, egun batzuk gehiago kardiologiako instalazioan.