PAZIENTEARI "A" TOXINA BOTULINIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEA SABEL-ETENA EGITEKO

Sabel-paretan ebakuntza kirurgiko batean egindako ebakidura baten **orbaintze txar** baten ondorioz gertatzen da **sabel-etena edo etena**.

Emaitza abdomeneko horman dagoen akats bat da (zuloa), zeinetatik abdomeneko edukia atera daitekeen (heste-lakioak). Horrek hestearen buxadura, mina eta, kasurik larrienetan, heste-nekrosia eragin ditzake (heste-lakio baten odol-fluxurik eza).

Kasu batzuetan, ebakuntza bidezko ebentrazioa konpondu baino 4-6 aste lehenago, sabelaldeko pareta prestatu behar da emaitza hobea lortzeko.

Hori A toxina botulinikoa erabiliz egiten da, ebakuntza aurreko neumoperiteneoarekin lotuta egon edo ez (sartu gasa sabelaldeko barrunbean).

Prozedura:

Ekografia bidez, muskulaturaren hiru puntu daude sabelaldeko hormaren alde bakoitzean.

Larruazala anestesiatu ondoren, botulina-toxinaren 50UI infiltratzen dira 6 puntuetako bakoitzean.

Prozedurak 30 minutu inguru irauten du.



AA tresnaren bidez sortutako irudia (Googleren irudiak sortzeko eredua)

Prozeduraren arriskuak

Kasu gehienetan, prozedura horrek ez du inolako eragozpenik sortuko, larruazalean "ziztada" ez bada.

Non egingo da proba?

AUOn, Txagorritxuko egoitzan, 2. solairuan, ebakuntza-gelako itxarongelan, C eta D korridoreen artean.

Nola prestatu behar dut probarako?

- Ekarri arropa erosoa, kentzeko eta jartzeko erraza.
- Ez eman kremarik sabelaldean.
- Ez da beharrezkoa baraurik joatea.
- No es necesario acudir en ayunas.

A toxina botulinikoa emateko kontraindikazioak:

Toxina botulinikoari alergia badiozu, abisatu medikuari.

Tratamendu hori aminoglukosidoekin (antibiotiko mota bat) kontraindikatuta dago

Arretaz erabili behar da, antibiotiko batzuekin lotuta, hala nola polimixinekin, tetraziklinekin eta linkomizinarekin, baita muskulu-erlaxatzaileekin ere.

Toxina botulinikoak izan ditzakeen kontrako erreakzioak:

Normala da muskulu-ahultasuna nabaritzea ziztada-eremuetan (farmakologikoki espero den toxina botulinikoaren ekintza da muskulu-ehunean).

Halaber, injekzio-puntuaren hurbileko eta/edo urruneko muskuluen ahultasuna ikusi da.

Edozein injekzio ematean bezala, min lokalizatua, hantura, inurridura, sentsibilitate lokala/gogortzea gutxitzea, mina haztatzean, gorritzea, infekzio lokalizatua, odoljarioa eta/edo hematomak ager daitezke.

Zer egin behar dut prozeduraren ondoren?

Ez da zainketa berezirik behar. Bizitza normala egin dezakezu.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD