



TRATAMIENTOS PARA EVITAR CIERTAS COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS

Se le prescribirá **SÓLO UNO** de estos tratamientos, el indicado con una X.

- ☐ Propranolol 10mgr o 40 mgr (marca comercial: Sumial®, Propranolol®): la dosis diaria de este fármaco se irá aumentando progresivamente siempre y cuando Ud. tolere la dosis indicada por el médico. Iniciará el fármaco con la mínima dosis y los aumentos de dosis se irán indicando en la consulta de enfermería.
Los efectos secundarios más frecuentes son: cansancio/fatiga, ritmo cardíaco enlentecido, tensión arterial baja, extremidades frías, pesadillas.

Semana 1	Propranolol 10mgr un comprimido cada 12 horas
Semana 2	Propranolol 10 mgr dos comprimidos cada 12 horas
Semana 3	Propranolol 10 mgr tres comprimidos cada 12 horas
Semana 4	Propranolol 40 mgr un comprimido cada 12 horas

- ☐ Carvedilol 6.25mgr (marca comercial: Coropres®, Carvedilol®): la dosis diaria de éste fármaco se irá aumentando progresivamente siempre y cuando Ud. tolere la dosis indicada por el médico. Iniciará el fármaco con la mínima dosis y los aumentos de dosis se irán indicando en la consulta de enfermería.
Los efectos secundarios más frecuentes son: cansancio/fatiga, mareo, dolor de cabeza, tensión arterial baja.

Semana 1	Carvedilol 6.25mgr un comprimido cada 24 horas
Semana 2	Carvedilol 6.25mgr un comprimido cada 12 horas

Digestivo/Unidad de Hepatología: Tel.: 945007573

Elaborado: marzo 2023

HI-DIGESTIVO-U. HEPATOLOGÍA-02

Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden.