



PREPARACIÓN DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES CON PEG

***Dos días antes de la colonoscopia:**

- 3 bolos de 450 cc (el volumen habitual que se administra el paciente en cada toma) de su dietoterápico habitual (sin fibra) (a las 8, 13 y 18 horas).
- A las 20 horas disolver el contenido de los sobres A y B de MOVIPREP® en un litro de agua y administrar en bolos de 250 cc por la sonda de gastrostomía cada 20 minutos lavando la sonda con 50 cc tras la administración de cada bolo.
- A las 22 horas deberá ponerse 4 bolos de 250 cc agua a temperatura ambiente separados por 20 minutos.

***Un día antes de la colonoscopia:**

- A las 8 horas deberá poner por la sonda de gastrostomía dos sobres de MOVICOL® de 25 ml lavando la sonda tras la administración de cada sobre con 30 ml de agua.
- 2 bolos de 450 cc de su dietoterápico habitual sin fibra (a las 8:30, 13) y un bolo de 200 cc (a las 18 horas).
- A las 20 horas disolver el contenido de los sobres A y B de MOVIPREP® en un litro de agua y administrar en bolos de 250 cc por la sonda de gastrostomía cada 20 minutos lavando la sonda con 50 cc de agua tras la administración de cada bolo.
- A las 22 horas deberá ponerse 4 bolos de 250 cc agua a temperatura ambiente separados por 20 minutos.

***El día de la colonoscopia:**

- 4 horas antes, disolver el contenido de los sobres A y B de MOVIPREP® en un litro de agua y administrar en bolos de 250 cc por la sonda de gastrostomía cada 20 minutos, lavando la sonda con 50 cc tras la administración de cada bolo. Al finalizar deberá ponerse 2 bolos de 250 cc de agua a temperatura ambiente separados por 20 minutos.
- No administrar nada a través de la sonda de gastrostomía 2 horas antes de la prueba.