



PEG-AK DITUZTEN PAZIENTEENTZAKO KOLONOSKOPIA PRESTATZEA

***Kolonoskopia baino bi egun lehenago:**

- 450 cc-ko 3 bolo (pazienteak hartualdi bakoitzean hartu ohi duen bolumena), bere ohiko dietoterapikotik (zuntzik gabe) (08:00etan, 13:00etan eta 18:00etan).
- 20:00etan, disolbatu MOVIPREP ® -ren A eta B zorroen edukia litro bat uretan, eta eman 250 cc-ko boloetan gastrostomia-zundatik 20 minutuan behin, zunda 50 cc-rekin garbituz bolo bakoitza eman ondoren.
- 22:00etan, 250 cc-ko 4 bolo ur jarri beharko dira giro-tenperaturan, tartean 20 minutuko aldea utzita.

***Kolonoskopia baino egun bat lehenago:**

- 08:00etan, gastrostomia-zundatik 25 ml-ko bi MOVICOL ® zorro jarri beharko dituzu, zorro bakoitza 30 ml-ko ur erabilia garbitu ondoren.
- 450 cc-ko 2 bolo zuntzik gabeko ohiko dietoterapikotik (08:30ean, 13:00etan) eta 200 cc-ko bolo bat (18:00etan).
- 20:00etan, disolbatu MOVIPREP ® -ren A eta B gutun-azalen edukia litro bat uretan, eta eman 250 cc-ko boloetan gastrostomia-zundatik 20 minuturo, zunda 50 cc-ko urarekin garbituz bolo bakoitza eman ondoren.
- 22:00etan, 250 cc-ko 4 bolo ur jarri beharko dira giro-tenperaturan, tartean 20 minutuko aldea utzita.

***Kolonoskopiaren egunean:**

- 4 ordu lehenago, disolbatu MOVIPREP ® -ren A eta B zorroen edukia litro bat uretan, eta eman 250 cc-ko boloetan gastrostomia-zundatik 20 minutuan behin, zunda 50 cc-rekin garbituz bolo bakoitza eman ondoren. Amaitzean, 250 cc-ko 2 bolo jarri beharko dira giro-tenperaturan, tartean 20 minutuko aldea utzita.
- Ez eman ezer gastrostomia-zundaren bidez proba egin baino 2 ordu lehenago.