



COLISTIMETATO DE SODIO (PROMIXIN[®]) 1 MILLÓN DE UNIDADES (MUI)

PARA QUÉ ES?

Es un antibiótico que actúa contra la infección producida por *Pseudomona Aeruginosa*.

CÓMO CONSERVARLO:

Conservar a TEMPERATURA AMBIENTE (a menos de 25 °C), dentro del envase.

CÓMO TOMARLO:

Se administra por vía inhalada, utilizando el dispositivo I-NEB. Su enfermera le indicará cómo conseguir el dispositivo I-neb, cómo administrar la medicación, y le dará el material necesario para ello.

La dosis habitual es 1 MUI cada 12h.

Si está tomando otras medicaciones por vía inhalada, recuerde utilizar el Promixin en el último lugar

¿Y SI OLVIDÓ UNA DOSIS?

Si olvida administrarse una dosis, deberá inhalarla tan pronto como lo recuerde, excepto, si la siguiente dosis está muy próxima.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

- Mareos, confusión, visión borrosa.
- Entumecimiento u hormigueo.
- Tos seca.
- Raramente podría ocasionar reacciones alérgicas. En caso de aparición de erupción cutánea, avise a su médico.

PRECAUCIONES ESPECIALES:



Si usted padece una Miastenia Gravis (enfermedad muscular rara), avise a su médico.



Indique a su médico y su farmacéutico la medicación que está tomando, especialmente antibióticos.

Es importante que avise si le van a operar.



No utilizar en el embarazo ni en el periodo de lactancia.



Tu médico comprobará el *funcionamiento* de tu riñón antes y durante el tratamiento.



En caso de efectos adversos como mareo, confusión o visión borrosa; no debe conducir o utilizar máquinas peligrosas.