



Tratamenduaren planifikazioa/Planificación del tratamiento

Kirurgia Anbulatorio Nagusia /Cirugía Mayor Ambulatoria

Pazientea/Paciente: **ANALGESIA L**

ARABA ESIKO FARMAZIA ZERBITZUA/SERVICIO DE FARMACIA OSI ARABA

## Paracetamol

Hartu ezazu zorro bat edo pilula bat 6 orduero 4egunetan.

AHOTIK/VIA ORAL

## Paracetamol

Tome un sobre o comprimido cada 6 horas durante 4 días.

## Ibuprofeno

Lehenengo egunean, Paracetamola hartu eta gero, mina gehiago baldin baduzu; hartu Ibuprofeno pilula bat gosarian, bazkarian eta afarian.

AHOTIK/ VIA ORAL

## Ibuprofeno

Si el 1<sup>a</sup> día, después de tomar el Paracetamol tuviera más dolor; tome 1 comprimido de Ibuprofeno en desayuno, comida y cena.

IO-HI-FARMAZIA/FARMACIA-05



## Kirurgia Ambulatorio Nagusia-Cirugía Mayor Ambulatoria

### Medikamentuen Informazioa/Información de medicamentos: **MINA L /DOLOR L**

ARABA ESI FARMAZIA ZERBITZUA/SERVICIO FARMACIA OSI ARABA

#### Paracetamol

- **Eragina:** mina (ANALGESIKOA) eta sukarra (ANTIPIRETICOA) txikitzen dituen botika
- **Kontuan hartzekoak:** botika hau janariekin edo janaririk gabe, har dezakezu, urdailean arazoren bat izanez gero, hartu elikagairen batekin. Beti baldintza beretan hartzea aholkatzen da bere eraginkortasuna handitzeko.  
Ez da komeni eta ez da eraginkorragoa agindutako dosia handitzea.  
Tratamenduak irauten duen bitartea, alkoholik ez hartzea komeni da.
- **Kontrako efektuak:** agindutakoa jarraituz gero, ez da ondorio kaltegarrikerik azaltzen.

#### Ibuprofeno:

- **Eragina:** mina txikitzen duen medikamentua (ANALGESICOA), hantura (ANTIINFLAMATORIOA) eta sukarra. Baita erreuma tratatzeko ere (ANTIRREUMATICO)
- **Kontuan hartzekoak:** hartu medikamentua baso bat urarekin, otorduekin edo elikagairen batekin urdaileko arazoak saihesteko.
- **Ez hartu botika hau, ASPIRANARI alergiarik badiozu.**  
Inoiz urdaileko edo duodenoko ultzerarik izan baduzu, adierazi zure medikuari Medikamentu honekin tratamendua hasi aurretik.  
Medikamentu hau hartu bitartean, ez hartu alkoholik, edari alkoholodunek urdaileko erredua handitzen baitute.

#### Paracetamol

- **Acciones:** medicamento que disminuye el dolor (ANALGESICO) y la fiebre (ANTIPIRETICO).
- **Consideraciones:** puede tomar este medicamento con o sin alimentos; si tiene molestias de estómago, tómelo con algún alimento. Se aconseja que lo haga siempre en las mismas condiciones para aumentar su eficacia.  
No es más eficaz ni conveniente aumentar la dosis prescrita.  
Mientras dure el tratamiento es aconsejable que no beba alcohol
- **Efectos adversos:** si sigue usted la pauta indicada, no suelen aparecer efectos adversos

#### Ibuprofeno

- **Acciones:** medicamento que disminuye el dolor (ANALGESICO), la inflamación (ANTIINFLAMATORIO) y la fiebre (ANTIPIRETICO). También, se usa para tratar el reuma (ANTIRREUMATICO).
- **Consideraciones:** tome este medicamento con un vaso de agua, en las comidas o con algún alimento para evitar posibles molestias de estómago.  
**NO tome este medicamento si es usted alérgico a la ASPIRINA.**  
Si usted tiene o ha tenido úlcera de estómago o duodeno, dígaselo a su médico antes de iniciar el tratamiento con este medicamento.  
Mientras tome este medicamento, no beba alcohol, ya que las bebidas alcohólicas aumentan la irritación del estómago.



Saiatu ez hartzen Aspirinarik edo beste botika batzuk, minerako, sukarrerako, hozturarako, zure mediku edo farmaziagileari galdetu gabe. Ahotiko antikoagulatzailak hartzen ari bazara, esan zure medikuari.

Haurdun bazaude, bereziki lehendabiziko hiru hilabetean, saihestu medikamentu hau hartzea.

- **Kontrako efektuak**-. Ohikoa ez bada ere urdailhesteetako arazoak ager daitezke (urdaileko mina, higuina edo goragalea) edo buruko mina. Sintoma hauek jarraituz gero, deitu zure medikuari.

Urdaileko min handia, edo kaka beltza eginez gero, galdetu zure medikuari.

Eskuen, oinen, orkatilen edo hanken hantura nabaritzuz gero, galdetu zure medikuari.

Beste edozein arazo nabaritzuz gero, medikamentu honek sortua dela uste duzuna, galdetu zure medikuari.

Procure no tomar aspirina u otros medicamentos para el dolor, la fiebre y el resfriado sin consultar a su médico o farmacéutico.

Si está tomando anticoagulantes orales dígaselo a su médico.

En caso de embarazo, especialmente durante el 3<sup>er</sup> trimestre, evite tomar éste medicamento.

- **Efectos adversos**: aunque no es frecuente pueden aparecer molestias gastrointestinales (dolor de estómago, náuseas, vómitos) o dolor de cabeza. Si estos síntomas persisten avise a su médico.

Si aparece dolor de estómago fuerte o las heces son negras, avise a su médico.

Si nota hinchazón de las manos, pies, tobillos o de las piernas, consulte a su médico.

Si nota cualquier otra molestia que cree que está producida por este medicamento, dígaselo a su médico.