



Tratamenduaren Planifikazioa/Planificación del tratamiento

Kirurgia Anbulatorio Nagusia/Cirugía Mayor Ambulatoria

Pazientea/Paciente: **ANALGESIA ML**

ARABA ESIKO FARMAZIA ZERBITZUA/SERVICIO FARMACIA OSI ARABA

## Paracetamol

Hartu pilula **bat**, ur baso batez ,6 orduero 2 egunez.

## Paracetamol

Tome un comprimido con un vaso de agua, **cada 6 horas** durante 2 días.

AHOTIK / VIA ORAL

IO-HI-FARMAZIA/FARMACIA-08



## Kirurgia Anbulatorio Nagusia/ Cirugía Mayor Ambulatoria

### Medikamentuen Informazioa/Información de medicamentos: MINA ML/DOLOR ML

ARABA ESI FARMAZIA ZERBITZUA /SERVICIO FARMACIA OSI ARABA

#### Paracetamol

- **Eragina:** mina (ANALGESIKOA) eta sukarra (ANTIPIRETIKO) murrizten duen medikamentua.
- **Kontuan hartu beharrekoak:** medikamentu hau jaki edo jakirik gabe har dezakezu; urdailean arazoren bat baduzu, hartu elikagairen batekin. Bere eraginkortasuna handitzeko, beti baldintza beretan hartzea gomendatzen da.  
EZ DA ERAGINKORRAGOA, EZTA KOMENIGARRIA ERE AGINDUTAKO DOSIA HANDITZEA.  
Tratametuak iraun bitartean, komenigarria da edari ahalkoldunik ez hartza.
- **Kontrako efektuak:** jarraibideak segituz gero, ez da kontrako efekturik agertzen.

#### Paracetamol

- **Acciones:** medicamento que disminuye el dolor (ANALGESICO) y la fiebre (ANTIPIRETICO).
- **Consideraciones:** puede tomar este medicamento con o sin alimentos; si tiene molestias de estómago, tómelo con algún alimento. Se aconseja que lo haga siempre en las mismas condiciones para aumentar su eficacia.  
No es más eficaz ni conveniente aumentar la dosis prescrita.  
Mientras dure el tratamiento es aconsejable que no beba alcohol
- **Efectos adversos:** si sigue usted la pauta indicada, no suelen aparecer efectos adversos.