



INFORMACIÓN PARA PACIENTES TRAS INSTILACIÓN INTRAVESICAL DE MITOMICINA / GEMCITABINA

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA:

- Si toma algún tratamiento para la tensión arterial o diurético, se deberá tomar después del tratamiento.
- Después del tratamiento, tras orinar, debe lavarse las manos y genitales para evitar posible reacción adversa al medicamento.
- Orine sentado los dos días siguientes después de la instilación. Tire dos veces de la cadena.
- Evitar las relaciones sexuales durante la 1ª semana posterior a la instilación, y, para la práctica de relaciones sexuales, debería usar preservativo.
- Beba abundante agua el día del tratamiento.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO:

- Es normal que durante las próximas horas después del tratamiento note escozor o alguna molestia al orinar (puede tomar cualquier analgésico de uso habitual, paracetamol o ibuprofeno cada 8 horas), que orine más veces de lo normal, o que orine algo de sangre. Si estos síntomas duran más de 24 horas, contacte con la consulta de urología.
- Puede tener fiebre durante las 24-48 horas después del tratamiento; puede tomar un antipirético (por ejemplo: paracetamol). Debe acudir al servicio de urgencias del hospital si la fiebre se prolonga más de 48 horas o se acompaña de empeoramiento del estado general.
- Es posible presentar picor en palmas de las manos y en la zona genital; si ocurre, contactar con el equipo de enfermería de la consulta de urología.