

LAGINA JASOTZEKO PROZEDURA, ODOLA GORozKIETAN ZEHAZTEKO

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LA MUESTRA PARA LA DETERMINACIÓN DE SANGRE EN HECES


-
- Gorde hodia haurrek ez hartzeko moduko tokian.
 - Ez egin proba, baldin eta odola darion hemorroideak edo hilekoa izanez gero harik eta 3 egun pasatu arte odol-galtzerik gabe.
 - Saihestu gorozkiak pizarekin kutsatzea.

-
- Mantener el tubo fuera del alcance de los niños.
 - No realizar la prueba si presenta hemorroides sangrantes o menstruación hasta que no hayan pasado 3 días seguidos sin pérdidas de sangre.
 - Evitar la contaminación de las heces con orina.
-




OC-SENSOR



1


Jarri komuneko papera komun-ontzi barruan eta eseri, ahal izanez gero, hari begira.

Colocar una capa de papel higiénico en el sanitario y sentarse si es posible de cara al mismo.

2


Kendu tapoi berdea eta atera kotoi-txotxa.

Desenroscar el tapón verde y extraer el bastoncillo.

3


Jarri kotoi-txotxaren punta gorozki ganean eta ibili alde batera eta bestera horizontalean eta bertikalean.

Poner en contacto la punta del bastoncillo con las heces y deslizar la punta dibujando líneas horizontales y verticales.

5


Nahikoa da lagin-kopuru txiki bat.

Es suficiente con poca cantidad de muestra.

6

Sartu kotoi-txotx berdea hodian, ongi tapatu eta eragin.

Introducir el bastoncillo verde dentro del tubo, taparlo bien y agitar.

7

Gorde hodia hozkailuan gehienez 3 egunez. Utzi proba zure osasun zentroan ahalik eta azkarren, bertan etiketatuko dute.

Conservar el tubo en la nevera un máximo de 3 días. Entregar lo antes posible la prueba en su centro de salud donde será etiquetada.