



RECOGIDA DE HECES PARA CULTIVO CONVENCIONAL

MATERIAL NECESARIO

Recipiente de boca ancha	Hisopo con medio de transporte bacteriano*
	

*Recogida de heces en pañal de niños en los que no es posible la toma de la muestra con la espátula.

TÉCNICA DE RECOGIDA DE LA MUESTRA

1. Recoger con un palito o cucharilla una pequeña cantidad de heces preferentemente de una zona con presencia de moco, sangre o pus.
2. Evitar el contacto con agua u orina. No deberá utilizarse papel higiénico para su recogida por la presencia de sales de bario que inhiben algunas bacterias patógenas en el mismo.

TÉCNICA DE RECOGIDA DE LA MUESTRA DEL PAÑAL

1. Si las heces se recogen del pañal, éstas deberán ser recientes y deberán recogerse de la zona más superficial.

TÉCNICA DE RECOGIDA DE LA MUESTRA CON HISOPO

1. Introducir el hisopo sobrepasando un poco el esfínter anal. Rotar para hacer la toma de las criptas anales.
2. Dejar 10 a 30 segundos para facilitar la absorción de los microorganismos y retirar el hisopo.

CANTIDAD

- Se requieren muestras del tamaño aproximado de una **nuez** (10 g); si las heces son líquidas, se recogerá un volumen de 5 a 10 ml.

PLAZO DE ENTREGA EN EL LABORATORIO

- Máximo: 24 horas.
- De no enviarse de inmediato al laboratorio, refrigerar a 2-8°C.