



LUTATHERA® BIDEZKO TRATAMENDUA (LU177 DOTATATE)

Zer da Lutathera®?:

Lutathera® Medikuntza Nuklearreko Zerbitzuan emandako tratamendu bat da, tumore neuroendokrino gastrikoak, hesteetakoak eta pankreakoak tratatzeko zuzendua eta onartua, somatostatinarekin hartzaileak adierazten dituztenak. Medikamentu hori tumore-zeluletako hartzaile horiekin batzen da, eta tumorea kaltetzen duen erradiazioa askatzen du.

Tratamenduaren onurak

- Azterketa klinikoek frogatu dute Lutathera® tratamenduak honako hauek egin ditzakeela:
 - Gaixotasunak aurrera egin gabeko denbora luzatzea.
 - Tumore-erantzun tasak hobetzea.
 - Tumore funtzionalekin lotutako sintomak kontrolatzen laguntzea.

Nola ematen da tratamendua?:

Tratamendu kopurua: 4 Lutathera® dosi jasoko dituzu, 8 astean behin emanda (tratamendu bakoitzaren artean 2 hilabete inguru). 6 hilabeteko iraupena, guztira.

Tratamendu egunean hauek egingo dira:

- Aldez aurreko elkarrizketa mediku nuklearrarekin, zalantzak argitzeko, tratamenduarekin lotutako sintomak argitzeko eta analisi-bolanteak emateko.
- Aminoazidoen zain barneko infusioa; gutxi gorabehera 4 ordu irauten du giltzurrunak babesteko. Beso kontralateraleko bena-sarbidea Lutathera® administratzera bideratzen da.
- Lutathera® infusioa, 30 minutu irauten duena, mediku-ikuskaritzapean egiten dena gure ospitalea.

Tratamendu osoak 6-7 ordu inguru irauten du ospitalean. Normalean, 15:00etatik 16:00etara emango zaio alta (ordutegi hori alda daitekeen arren).

Medikuntza Nuklearreko zerbitzuan dosi bakoitza hartu eta 24 ordura deituko dizugu miaketa bat egiteko (gorputz osoko irudiak lortzeko).

Tratamenduaren aurreko prestatzea:

Bertan behera utzi behar diren botikak:

- Eragin luzeko somatostatinarekin analogoak (adibidez, Octreotide LAR edo lanreotida) tratamendu bakoitza baino 4 aste lehenago.
- Eragin laburreko somatostatinarekin analogoak (Octreotidea, adibidez), tratamendu bakoitza egin baino 24 ordu lehenago.

Tratamendua eskatu dizun medikuak esango dizu noiz berrabiarazi ditzakezun sendagai horiek (normalean, tratamendua egin eta 24 ordura).



Antisorgailuak (ugaltzeko adinean dauden pazienteetan):

- Emakumeek antisorgailu efektiboak erabili behar dituzte azken dosia hartu eta 7 hilabetera arte.
- Gizonek antisorgailu efektiboak erabili behar dituzte azken dosia hartu eta 4 hilabetera arte.
- Medikuntza Nuklearreko Zerbitzura iristean, tratamendu bakoitzaren aurretik haurdun ez dagoela egiaztatuko da hilekoarekin jarraituz gero.

*Ugalkortasuna

- Lutathera® tratamenduak antzutasuna eragin dezake gizonengan zein emakumeengan. Hitz egin zure medikuarekin (onkologo igorlearekin) tratamendua hasi aurretik ugalkortasunari buruzko kezkarik baduzu.

Zer itxaron tratamenduak iraun bitartean?:

- Aminoazidoen infusioa: Infusio hori funtsezkoa da giltzurrunak babesteko. Paziente batzuegan goragalea eragin dezake.
- Sendagai antiemetikoak: benabarneko sendagai bat jasoko duzu aminoazidoak infusionatu aurretik, goragaleak eta gorakoak prebenitzeko.
- Monitorizazioa: tratamendua egin eta gutxienez 2 ordura kontrolatuko da, edozein erreakzio alergiko detektatzeko.

Albo-ondorio posibleak:

- Albo-ondorio arruntak:
 - Goragaleak (pazienteen % 27k izaten du).
 - Beherakoa (% 26k).
 - Dolor abdominal (% 18k).
 - Nekea.
 - Odol-analisien aldaketak (anemia, plaketak gutxitzea, linfozito txikiak).
 - Entzima hepatikoak handitzea.
- Albo-ondorio larriak, baina ez oso ohikoak:
 - Hezur-muina kentzea (odol-zelulak gutxitzea).
 - Giltzurrunetako toxikotasuna (giltzurrunei egindako kaltea).
 - Toxikotasun hepatikoa (gibeleko kaltea).
 - Syndrome mielodisplasikoa edo leuzemia (% 2-3, normalean hurrengo 29-55 hilabeteetan).

Jarraipena egitea tratamenduan zehar eta ondoren:

- Tratamendu hau eskatu dizun mediku-taldeak kontrol analitikoa egingo dizu aldizka, hematimetria, giltzurrun-funtzioa eta gibel-funtzioa barne.



Erradiazio bidezko segurtasun-neurriak:

- Hidratazio eta mikzio sarria:
 - Edan likido ugari lehenago, tratamenduaren egunean eta hurrengo egunean.
 - Maiz pixa egiten du gorputzeko erradiazioa kentzeko.
 - Tratamendua egin eta 30 egunera arte detekta daiteke erradiazioa gernuan.
- Etxean hartu beharreko neurriak (batez ere lehen 3 egunetan):
 - Gizonek pixa egitean eseri behar dute.
 - Bota katetik bi aldiz bainugela erabili ondoren.
 - Garbitu eskuak ura eta xaboa erabiliz bainua hartu ondoren.
 - Ahal baduzu, erabili bainugela bat etxean soilik zuretzat.
 - Ohe batean lo egin, bikotekidearengandik aparte.
 - Gorde 2 metro inguruko distantzia beste pertsona batzuekiko, bereziki haurrak eta haurdun dauden emakumeak.
 - Mugatu beste pertsona batzuekiko kontaktu hurbil luzea.

Noiz jarri harremanetan medikuarekin?: Mediku onkologoa edo Larrialdi Zerbitzua

- Jakinaraz ezazu hauek esperimendatzen badituzu:
 - Infekzio-zantzuak (sukarra, hotzikarak).
 - Odolusteak edo ezohiko hematoma.
 - Sekulako nekea.
 - Goragalea edo okada iraunkorrak.
 - Gernuaren aldaketak (kantitatea murriztea, kolore iluna).
 - Sabeleko min handia.
 - Arnasa hartzeko zailtasuna.
 - Aurpegiko gorritasuna, beherako larria, presio arterial baxua (krisi kartzinoidearen zantzuak).