



AHO BIDEZKO KORTIKOIDEAK ESKAINTZEA ESKLEROSI ANIZKOITZAREN-AGERRALDIK TRATATZEKO

TRATAMENDURAKO JARRAIBIDEAK:

- Tratamenduaren iraupena 3 edo 5 egunekoa izango da, Zure neurologoak adierazitakoaren arabera..
- Metilprednisolona (solu-medrin®) gramu 1 litro bat ur mineraletan nahastua gutxi gora behera 60 minututan hartu beharko dena. Baso bat 15 minutuko.
- Zure neurologoak eman ahal dizu, hala ikusten badu, babesle gastriko bat gosaldutik aurreko 30 minutu aurretik hartzeko eta ansiolitiko/hipnotiko bat gauzez oheratu aurretik hartzeko.

MEDIKAZIOA EGOKI HARTZEKO JARRAIBIDEAK

Hartu medikazioa egunero ordu berean, bereziki goizeko lehendabiziko orduetan.

- 1.- Metilprednisolona hartu gosaltzeko
- 2.- Zure ohiko medikazioa hartuz jarrai dezakezu
- 3.- Metilprednisolona nahastu bide likidoa hauts bideari gehituz eta leunki eraginez
- 4.- Nahasketa hori gehitu litro bat ur mineraletan
- 5.-Gutxi gora behera hartu prestakina ordu 1ean, zapore mikatza onartzen ez baduzu, zuku piska bat gehitu diezaiokezu.

Edozein inzidentzia dela eta, ipin zaitez harremanetan zure erreferentziazko neurologoarekin edo hurbil zaitez Larrialdi Zerbitzuetara.

