



CETUXIMAB (Cada 15 días)	EFECTOS SECUNDARIOS	CUIDADOS GENERALES
<p>CETUXIMAB (Erbitux®)</p> <p>Anticuerpo monoclonal químérico con expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toxicidad dérmica: erupción acneiforme, prurito, sequedad cutánea, descamación y trastornos ungueales (por ej.: paroniquia, inflamación de la piel que rodea las uñas de los dedos de manos y pies). • Hipertricosis (aumento del vello de la cara). • Tricomegalia (aumento del crecimiento de pestañas y cejas). • Aftas/llagas. • Diarrea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beber 1½ a 2 litros (=8 vasos) de líquidos (zumos, caldos, agua, infusiones...). • Conveniente dar dos veces a la cisterna o echar lejía al WC. • Cuidado de la piel: <ul style="list-style-type: none"> - Hidratación y protección solar. - Cuidados de la piel según información adjunta. • Cuidados de la mucosa oral: <ul style="list-style-type: none"> - Higiene bucal con cepillo suave. - Colutorios sin alcohol. - Enjuagues manzanilla temperatura ambiente. - Si aftas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Enjuagues con bicarbonato. ✓ Alimentos blandos templados a fríos. - Si dificultad para masticar o tragar: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consultar. • Alteraciones del patrón intestinal: <ul style="list-style-type: none"> - Manejo con dieta. - Si alteración importante: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consultar. • Cuidados en la mielosupresión: <ul style="list-style-type: none"> - Si temperatura ↑38°C: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acudir a urgencias sin tomar ningún fármaco. - Evitar espacios cerrados. - Evitar contacto con personas con procesos infecciosos. - Higiene de manos.



EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES:

- MIELOSUPRESIÓN = Bajada de defensas, bajada de plaquetas y anemia (controles analíticos).
- FATIGA/ASTENIA/CANSANCIO:
 - Aumentar períodos de descanso.
 - Mantener cierta actividad: pasear, bicicleta, realizar tareas...

TELEFONOS DE CONTACTO: 945007500 (Call Center de 8 a 20h) y Consulta de enfermería 1 (despacho 5 frente a box14) **945007381.**

Recomendaciones ante diarrea:

- Asegurar aporte de líquidos que aporten electrolitos (bebidas isotónicas), limonada alcalina, suero-oral...
- Dieta astringente (arroz, patata-zanahoria, plátano, manzana, membrillo....). Suprimir alimentos con lactosa, fibra vegetal, grasas, embutidos, fritos y especias.
- Si fiebre acompañante: contactar para valoración.
- Si diarrea acuosa: loperamida (Dosis inicial de 2caps. Posterior 1 cap/4horas o 1cap tras cada deposición. Máximo 8 caps/día).
- Si no respuesta a indicaciones contactar para valoración.

OBSERVACIONES, CONSEJOS:

Elaborado: abril 2022

HI-ONCOLOGÍA

Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden.