



EMLA KREMA

Zain-ziztadetako prozeduretan erabiltzen den krema anestesikoa (anestesia topikoa).

Ezin izango diozu semeari edo alabari EMLA krema aplikatu, kontraindikazioa dela-eta honako kasu hauetan:

- Alergia lidokainari eta/edo prilokainari.
- Glukosaren defizit osoa edo partziala -6 PD
- 12 hilabete baino gutxiago izatea sulfamidekin, nitro-prusiatoarekin eta fenitoinarekin tratamenduan.

ADMINISTRAZIO TEKNIKA:

- Eskularruak jantzi.
- Jarri krema ordubete lehenago eskuaren atzealdeko ageriko zainetan, edo larruazala osorik dagoen besoko tolesturetan (zauririk eta lesiorik gabe).
- Krema zabaldu gabe, apositu garden itsasgarri batekin babestuko dugu.
- Tolestura bakoitzean aplikatu beharreko krema kantitatea garbantzuz bat bezalakoa izango litzateke.



KONTUAN HARTZEKOA

- Noizbehinka edema, gorritasuna edo azkura ager daitezke, arinak eta iragankorrak.
- Saihestu haurrak krema manipulatzeko AHORATZEKO EDO BEGIZ BEGIKO HARREMAN arriskuagatik.
- Dermatitis atopikoa, psoriasis edo ekzema izanez gero, krema aplikatu prozedura baino 30 minutu lehenago, krema lehenago xurgatzen baita.