



JAIÖBERRIEN SORTZETIKO HIPOTIROIDISMOAREN BAHEKETA- PROTOKOLOA EAEn/PROTOCOLO DE CRIBADO NEONATAL DEL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO EN LA CAPV.

Haurdunaldi bikietan (sexu berekoak), fetuen arteko transfusioa gerta daitekeelako, sortzetiko hipotiroidismoaren baheketan positibo/negatibo faltsuak eman daitezke bizitzako lehen egunetan.

En embarazos gemelares (del mismo sexo), debido a la posibilidad de una transfusión feto-fetal, se podrían dar falsos positivos/negativos en el cribado del hipotiroidismo congénito en los primeros días de vida.

Hori dela eta, bi aste betetzen dituztenean seme-alabei proba errepikatzeko hitzordua bidaltzen dizuegu honekin batera.

Por este motivo, adjuntamos una cita para repetir la prueba a sus hijos o hijas cuando cumplan dos semanas de vida.

Emaitza aldatuta badago, zuekin harremanetan jarriko gara, orpoko proban bahetzen diren gainerako gaixotasunekin bezala.

En caso de resultado alterado, nos pondremos en contacto con ustedes como con el resto de las enfermedades que se criban en la prueba del talón.